

# Voyage en Roumanie

*du 27 juillet au 14 août*

par Samuel Progin,  
Romain Béguelin  
et David Berthold


C'est de bon matin que nous partîmes pour ce périple de deux semaines en Roumanie. Après un voyage en train de 33h, nous arrivons enfin à Bucarest, ville marquée par un proche passé communiste. A peine arrivé, nous prenons un bus pour Calarași puis un taxi pour rejoindre l'embarcadère du ferry-boat.

Durant la courte traversée, nous apercevons environ 125 Cormorans pygmées en vol et nos premiers Goélands pontiques posés sur les plages de sable ! Sur le ferry-boat, nous faisons la connaissance de l'ancien maire de Lipnița, charmant petit village proche de la frontière bulgare et de notre première étape, Feeti Vallée, un des derniers endroits en Roumanie où niche le mythique Aigle impérial et qui accueille également une grande diversité d'autres rapaces et passereaux. Il nous propose de nous y amener et nous présente Marian, le responsable de la vallée qui nous donne l'autorisation d'y camper et qui nous montre l'endroit parfait pour s'installer avec, luxe inespéré, une source d'eau potable à proximité.

Durant la première partie de la nuit, nous entendons les hurlements des chacals. Nous nous levons avec le soleil et nous dirigeons vers la vallée située à environ 1km de notre lieu de camping. En chemin, nous nous arrêtons au bord d'un petit étang où nous observons Crabier, Blongios, Bihoreau, Héron pourpré et cendré, Aigrette garzette, Guifette moustac et Rousserolle turdoïde en nombre plus ou moins important !

Arrivé à l'entrée de la vallée, une Buse des steppes nous survole, mais notre attention est vite sollicitée par un énorme rapace qui tourne 2 ou 3 fois avant de disparaître, masqué par les arbres ! Première et brève rencontre avec l'Aigle impérial ! Un adulte !

Après la traversée d'une forêt, nous arrivons aux pieds des falaises et décidons de poser la tente. Dans cette vallée, nous observons 3 Circaètes dont un avec un serpent dans le bec ! Egalement 1 Buse féroce, 1 Faucon pèlerin ad (espèce peu



commune dans cette partie de la Roumanie), 2 Eperviers à pied à court (un mâle et une femelle), 2 Eperviers d'Europe, 1 Autour, 2 Aigles bottés (phase sombre et sombre plus clair), 1 Aigle impérial juv., 2-3 chanteurs de Petit Duc scops, 1 Rossignol progré, de nombreuses Hirondelles rousselines, de nombreux Guépriers, quelques Alouettes lulus !

Nous sommes invités chaque midi à Lipnița où le repas nous est offert par les habitants ! Le chemin de Feetii Vallée à Lipnița est long à pied mais nous réserve quelques surprises telles que Rollier, Pie-grièche à poitrine rose, 2 Pics syriaques juv., 1 Aigle botté (phase clair)... ! Nous sommes allés un soir au bord du petit étang et avons vu deux Engoulevents d'Europe que nous entendions les soirs précédents !

Ce matin, nous prenons le microbus, moyen de transport rapide et très bon marché, pour aller à Constanța. Puis nous allons jusqu'à Mangalia où nous galérons pour savoir où se trouve Hagieni et comment y aller. Finalement, c'est en taxi que nous arrivons dans ce petit village où il n'y a ni téléphone ni petit magasin. Nous nous arrangeons avec le taxi pour qu'il vienne nous reprendre le lendemain au même endroit. Nous sommes à Hagieni, mais nous ne savons toujours pas où est le bon coin. Nous marchons un peu au hasard et finalement, nous découvrons une grande roselière avec plein de moustiques. De grands groupes d'Etourneaux survolent la roselière et nous distinguons des Etourneaux roselins parmi les sansonnets. Un petit moment plus tard ce sont 11 Hérons pourprés qui nous survolent à leur tour.

Le lendemain matin nous nous levons de bonne heure, la roselière étant située dans le creux d'une combe, nous nous postons sur l'un des versants afin de surplomber les marais. De là, nous avons une vue parfaite sur toute la roselière et c'est certainement ce qui fait le charme de cet endroit unique pour observer les oiseaux des marais habituellement très difficiles à voir. Mais ce sont d'abord des Fauvettes babillardes postées dans les bosquets juste devant nous qui attirent notre attention. Puis un petit oiseau montre le bout de son bec et sort des roseaux, c'est une Marouette poussin qui sera bientôt imitée par 4 autres !





Alors que le Lorient chante dans les arbres proches, nous observons des Blongios nains, des Hérons pourprés et un Bihoreau gris posté à l'affût d'une proie. La roselière est également un énorme dortoir à Hironnelles de rivage qui attirent des rapaces comme le Faucon hobereau, l'Épervier d'Europe ou encore l'Autour des palombes. Nous observons également un Phragmite des joncs, des Rousserolle turdoïdes, effarvattes et verderolles. Plus tard, une Buse féroce forme sombre nous survolera.

L'après-midi, nous nous rendons à Histria en microbus. Histria est un vestige de l'époque romaine où se trouve des marais et des plaines humides mais en grande partie sèche à cause de la canicule qui règne depuis le printemps. L'arrêt de bus se situe à environ 2km des marais et des étangs et à 8km des ruines et du restaurant.

La première chose que nous remarquons le lendemain matin est un grand vol de Pélicans blancs qui planent au-dessus des étangs. Nous avançons quelque peu dans les marais et remarquons le nombre de limicoles présents, principalement des Chevaliers sylvains et des Combattants, mais aussi quelques stagnatiles, arlequins, guignettes, culs-blancs, 2 Bécassines des marais, des Bécasseaux de Temminck, minutes, cocorlis, variables, une dizaine d'Avocettes, une vingtaine d'Echasses, 6 Barges à queue noire, des Petits Gravelots et à collier interrompu, une vingtaine de Courlis cendrés, une cinquantaine de Glaréoles à collier, 4 Spatules, une quarantaine d'Ibis falcinelles, quelques Crabiers, de nombreux Hérons pourprés et cendrés, des Bihoreaux et Blongios quelques Pies-grièches à poitrine rose, un groupe d'Étourneaux rosélins adultes, 3 Pipits rousselines, de nombreuses Bergeronnettes printanières (ssp *dombrowskii*), 1 Sterne naine, 1 hanel, 1 caugek et quelques pierregarins. Les 3 espèces de Guifettes, 1 Chevêche, quelques Rolliers, une quarantaine d'Oies cendrées, 3 Coucous, 2 Phragmites, quelques Tadornes de Belon, des Guépriers mais surtout : Romain observera un Faucon sacré que nous ne retrouverons malheureusement pas !

Nous profitons des heures les plus chaudes de la journée pour nous baigner dans le lac. Nous arrivons même à capturer 2 Couleuvres à collier et nous voyons une Couleuvre tesselé avec un poisson dans la gueule ! Un peu plus tard, nous apercevons aussi une sous-espèce de la Couleuvre à collier avec deux lignes blanches sur les flancs !

Le soir même, en rentrant du bistrot, un passereau attire notre attention, allure de Rousserolle, petit, brun, un sourcil bien marqué, le croupion roussâtre, la pointe de la mandibule inférieure sombre, aucun doute, c'est une Rousserolle isabelle ! Après quelques minutes de « pschitting » ce sont en tout 4-5 individus qui se montre accompagnés de Rousserolles effarvates et turdoïdes !



Le lendemain, en se dirigeant vers les ruines, nous remarquons un Pélican tournoyant seul dans le ciel. On le met au télescope, et surprise, le dessous des ailes est blanc, c'est un frisé ! Nous partons de ce lieu mythique après une dernière matinée de scanning. En attendant le microbus, nous tentons de faire du stop. Un des deux douaniers qui se trouvaient là arrête une camionnette et demande au chauffeur de nous emmener. Sympa le douanier ! Nous arrivons maintenant à Babadag, endroit tant réputé pour ses rapaces qui se trouvent, d'après nos infos, à l'ouest de la ville. Sac au dos, nous marchons dans cette direction. Première pause et petit tour d'horizon aux jumelles et, oh surprise, ... une femelle de Busard pâle !


Nous installons la tente au bord du lac. Le lendemain, après qu'un jeune Epervier à pied court nous a survolé, nous prenons la direction des collines se trouvant à l'ouest de la ville. Nous passons devant un étang et après un petit moment d'observation, nous tombons sur un Fuligule nyroca.

Notre chemin se poursuit lorsque le passage de deux Buses féroces, ainsi que 2 Aigles pomarins et une femelle de Busard cendré monopolise notre attention ! Puis un Aigle botté phase claire tournoie à 10-15m au-dessus de nos têtes. Moment unique ! Arrivé en haut d'une colline, nous pouvons entendre le chant d'une Caille tout en observant deux Buses féroces posées sur la bosse d'en face. Alors que nous pique-niquons, un Faucon nous interrompt... c'est un Faucon sacré !

Nous reprenons maintenant la direction de la ville pour aller ce coup-ci, passer une nuit à l'hôtel. Sur notre chemin, nous rencontrons encore deux ou trois Buses des steppes, une Alouette calandre, un Phragmite des joncs, deux Circaètes... ! La nuit suivante se fera également à l'hôtel, ça vous refait un homme !

Le lendemain, nous partons en direction de la forêt qui se situe au sud-ouest de Babadag. Nous montons au sommet de la colline et décidons de nous poser et d'attendre de voir ce qui bouge. C'est ainsi que nous voyons quelques Pouillots siffleurs, fitis, véloces et surtout orientaux (ssp du Pouillot de Bonelli élevée au rang d'espèce) ! Nous continuons notre chemin lorsque nous entendons l'alarme de

deux Buses variables. A ce moment-là, apparaît un rapace énorme au-dessus de nos têtes juste dans une troué d'arbres, la queue toute blanche, nous ne rêvons pas, c'est un Pygargue à queue blanche adulte qui nous survole au beau milieu de la forêt !




Nous décidons de redescendre par un autre versant de la colline. Nous empruntons un chemin et arrivons dans une sorte de sous-bois bien touffu, c'est alors que surgit un Gobemouche nain à une dizaine de mètres de nous ! Nous en restons bouche bée !

Nous n'étions pas au bout de nos surprises, car arrivés à l'orée de la forêt, à l'entrée de Babadag, nous voyons une grosse mésange grise au masque et à la bavette noire s'envoler. C'est une Mésange lugubre que nous pourrions observer à loisir dans des arbres proches ! Nous redescendons à l'hôtel afin de profiter encore de cet endroit idyllique.

Le lendemain matin, nous nous en allons vers le sud-est afin de traverser les collines encore inexplorées. Un Busard pâle femelle nous tourne autour à 10 m. Certainement le même que le premier jour. Nous voyons encore trois Pygargues à queue blanche juvéniles au loin ainsi que trois Aigles pomarins, quatre Faucons kobez et deux Mésanges lugubre.

Après une nuit de camping près de la forêt, nous voyons encore une Mésange lugubre, un Pic syriaque et une Bondrée. Puis, direction Vadu, petit village côtier à proximité de Sacele. En chemin, nous observons deux Faucons kobez, quelques Pies-grièches à poitrine rose, un Circaète, quatre juvéniles d'Etourneau roselin et surtout deux Faucons crécerelles ! Arrivée nocturne dans les marais de Vadu où nous plantons la tente à côté d'un étang. Avons-nous eu une intuition quant au choix de l'emplacement de la tente ? Peut-être, car le lendemain, à peine avons nous mis la tête dehors, que nous observons pas moins de six Phalaropes à bec étroit qui pêchent à moins de 5m de nous !!!



En nous promenant dans les étangs, nous voyons encore une septantaine de Glaréoles à collier, un Courlis corlieu, une Barge à queue noire, des Chevaliers stagnatiles, gambettes, arlequins, sylvains, culs-blancs, aboyeurs, guignettes, des Bécasseaux cocorlis, de Temminck, minutes, variables et deux autres Phalaropes à bec étroit !



En nous rapprochant de la mer, nous voyons encore une Rousserolle isabelle, une femelle d'Épervier à pied court, trois Cochevis huppés, de nombreuses Bécassines des marais, trois Spatules et deux Ibis. Après une baignade dans la Mer Noire en étant survolé constamment par de nombreuses Sternes naines, quelques caugeks et un Goéland railleur, nous nous promenons le long de la côte au bord de laquelle nous observons sept Huîtriers, six Tournepierrres, une quarantaine de Bécasseaux sanderlings, de nombreux Grands Cormorans pêchant en compagnie de quelques Cormorans pygmées et de deux Pélicans frisés.


Petit pause pique-nique vite interrompue par le passage éclair de deux Sternes caspiennes en pleine migration ! Au large, une vingtaine de Mouettes mélanocéphales sont posées sur la mer calme. Nous marchons jusqu'à Vadu pour nous ravitailler et profitons de faire une partie de ping-pong dans le bistrot du coin !

Nous installons la tente sur la plage pour passer la nuit. Le lendemain, c'est un marathon que nous avons à faire car nous devons parcourir en deux heures le trajet accompli en cinq heures à l'aller. Durant cette folle chevauchée, nous observons 17 Bécasseaux falcinelles en escale avec d'autres limicoles, dont une Barge à queue noire, un Chevalier stagnatile et deux Phalaropes à bec étroit dans un petit étang !



Juste avant de retraverser Vadu, un mâle de premier été de Faucon kobez vient se mettre en évidence sur un fil. Durant ce retour ultra rapide, nous avons quand même le temps d'observer un jeune Circaète et un jeune Etourneau roselin.

Marathon réussi, nous prenons le microbus pour Tulcea, cité balnéaire où l'ont dormira dans un hôtel. Le lendemain matin, nous prenons un bateau pour visiter le Delta du Danube (50CHF par personne). Nous sommes installés comme des rois, vautés à



l'avant. Nous entrons dans un petit canal depuis lequel nous observons aisément les différents ardéidés tels que Bihoreau, Crabier, Héron pourpré et cendré, Aigrette garzette et Grande Aigrette ainsi que les espèces caractéristiques du Delta comme les Pélicans blancs, les Cormorans pygmées, les Ibis falcinelles, une trentaine de Tadornes casarcas, trois Pigeons colombins, de nombreux Martins-pêcheurs, deux Faucons kobez, un jeune Epervier à pied court, un Faucon hobereau, des Chevaliers culs-blancs et aboyeurs, des Barges à queue noire, un Rossignol philomèle,... ! Ce qui est surtout marquant dans le Delta c'est le nombre impressionnant d'oiseaux ! Il y a un Crabier tout les dix mètres environ et deux fois plus de Bihoreau ! Mais malheureusement, la diversité est nettement moins grande que dans la drobogea (région de Roumanie bordant la Mer Noire).

Après cette journée dans le deuxième plus grand delta d'Europe (après celui de la Volga) nous allons à un festival plein air et rentrons à l'hôtel tard dans la nuit. Après un réveil tardif, nous allons voir les horaires de train et fouillons un moment les buissons le long du Danube. Les Hypolaïs et autres Fauvettes attendus ne se montrent malheureusement pas et il est déjà l'heure de rejoindre Bucarest. Arrivée nocturne dans la capitale après sept heures de train. Nous passons une nuit à l'hôtel et c'est déjà le jour du grand départ. Nous explorons encore rapidement un parc et c'est l'heure de partir !

A cause de la douane roumano-hongroise, nous arrivons à Vienne avec trois heures de retard ce qui nous fait rater la correspondance. Mais par chance un deuxième train part une heure trente plus tard. Et, après trente-six heures de voyage, nous arrivons enfin à Bâle d'où nous regagnons Delémont en voiture pour une nuit réparatrice.

Ainsi se termine notre périple roumain si riche en émotions et découvertes !

## Liste des oiseaux observés

### Spots

1. Vallée de Fetii (28-31.07.2003)
2. Hagieni (1-2.08.2003)
3. Histrtia (3-5.08.2003)
4. Babadag (5-9.08.2003)
5. Vadu (9-11.08.2003)
6. Delta du Danube (12.08.2003)




1. **Grèbe à cou noir** (2 ind. au 3 ; ~6-7 ind. au 5)
2. **Grèbe castagneux** (3 ind. au 2 ; ~5 ind. au 3 ; 4)
3. **Grèbe huppé** (2 ; 3 ; 4 ; 5)
4. **Pélican blanc** (quelques centaines au 3 ; 40-50 ind. au 4 ; 1 au 5 ; 6)
5. **Pélican frisé** (1 ind. au 3 ; 2 ind. au 5)
6. **Grand Cormoran** (3 ; 5 ; 6)
7. **Cormoran pygmée** (~125 depuis le Ferry boat (vers C"l"ral i) ; 6ind. au 3 ; 5 ; 6)
8. **Blongios nain** (~5 ind. au 1 ; ~4 ind. au 2 ; 4 ind au 3 ; 1Ξ au 6)
9. **Bihoreau gris** (~10 ind. au 1 ; ~5 ind. au 2 ; ~5 ind. au 3 ; 2ind. au 4 ; 5 ind. au 5 ; 6)
10. **Crabrier chevelu** (1 ad. au 1 ; 2 ind. au 3 ; 2 ind. au 4 ; 6)
11. **Aigrette garzette** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
12. **Grande Aigrette** (3-4 ind. au 3 ; 6)
13. **Héron cendré** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
14. **Héron pourpré** (1 ; 11 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
15. **Cigogne blanche** (~15 ind. depuis le train ; ~6-7 ind. au 1 ; 2 au 2 ; 3 ; 2 ind. au 4 ; 2 ind. au 5 ; quelques ind. au 6)
16. **Ibis falcinelle** (~60 ind. au 3 ; 2 ind. au 5 ; 6)
17. **Spatule blanche** (~10 ind. au 3 ; 3ind. au 4 ; 6 ind. au 5)
18. **Cygne tuberculé** (2 juv. et 1 ad. au 2 ; 1 famille au 3 ; 1 ad. au 5 ; 6)
19. **Oie cendrée** (~40 ind. au 3 ; 16 ind. au 4 ; ~70 ind. au 5)
20. **Tadorne de Belon** (~6-7 ind. au 3 ; 5)
21. **Tadorne casarca** (~30 ind. au 6)
22. **Canard colvert** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
23. **Canard souchet** (5)
24. **Sarcelle d'été** (1 ind. au 3 ; 4 ; 5)
25. **Fuligule milouin** (1 ; 2 ; ~5 ind. au 3 ; 4 ; 5)
26. **Nette rousse** (4 ; 5)
27. **Fuligule nyroca** (1 ind. au 4 ; ~10 ind. au 5)
28. **Pygargue à queue blanche** (1 ad. et 3 juv. au 4)
29. **Aigle impérial** (1 ad. et 1 juv. au 1)
30. **Aigle pomarin** (~5 ind. au 4)
31. **Circaète Jean-le-blanc** (3 ind. au 1 ; 3 ind. au 4 ; 1 juv. au 5)
32. **Aigle botté** (3 ind. (1 sombre, 1 sombre variante plus pâle et 1 pâle) au 1 ; 3 ind. (2 pâles et 1 sombre) au 4)
33. **Busard des roseaux** (3 ; 4 ; 5 ; 6)
34. **Busard cendré** (1X au 4)
35. **Busard pâle** (1X au 4)
36. **Buse féroce** (1 ad. au 1 ; 1 ind. au 2 ; ~7 ind. au 4)
37. **Buse variable** (1 ind. au 1 ; ~6 ind. au 4 ; 1 ind. au 5)
38. **Buse des steppes** (1 ind. au 1 ; ~4-5 ind. au 4 ; 1 ind. au 6)
39. **Bondrée apivore** (1 ind. au 2 ; 3 ind. au 4)
40. **Epervier d'Europe** (1X ad. au 1 ; 3 ind. au 2 ; quelques ind. au 4)
41. **Epervier à pieds courts** (1X ad. et 1Ξ ad. au 1 ; 1 juv. au 4 ; 1X ad. au 5 ; 1 juv. au 6)
42. **Autour des palombes** (~5 ind. au 1 ; 2 ind. au 2 ; 1 ind. au 4)
43. **Faucon crécerelle** (1Ξ au 1 ; 3 ; 4 ; 5)
44. **Faucon crécerellette** (1Ξ (1<sup>er</sup> été) et 1X au 5)
45. **Faucon kobez** (4 ind. (dont min. 2Ξ) au 4 ; 2Ξ (1 ad. et 1 1<sup>er</sup> été) et 1Xad. au 5 ; 1X. et 1 ind. au 6)
46. **Faucon hobereau** (1 ind. au 1 ; 1 ind. au 2 ; ~2 ind. au 3 ; 2 ind. au 4 ; 2 ind. au 6)
47. **Faucon pèlerin** (1 ind. au 1)
48. **Faucon sacre** (1 ind. au 3 ; 1 ind. au 4)
49. **Caille des blés** (3 ♀ au 3 ; 1 ♀ au 4)
50. **Râle d'eau** (1 juv. au 2 ; quelques ♀ au 3)




51. **Faisan de colchide** (type *colchicus*) (1X au 3 ; 1Ξ au 5)
52. **Marouette poussin** (~4 ind. et 1Ξ ad. au 2)
53. **Poule d'eau** (6 ind. au 2 ; 4 ; 5 ; 6)
54. **Foulque macroule** (1 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
55. **Huitrier pie** (15 ind. au 5)
56. **Avocette élégante** (11 ind. au 3)
57. **Echasse blanche** (~10 ind. au 3 ; 5)
58. **Glaréole à glaréole à collier** (~50 ind. au 3 ; 5)
59. **Petit Gravelot** (quelques ind. au 3 ; quelques ind. au 5)
60. **Gravelot à collier interrompu** (quelques ind. au 3 ; quelques ind. au 5)
61. **Vanneau huppé** (3 ; 4 ; 1 ind. au 5 ; 1 ind. au 6)
62. **Bécasseau sanderling** (quelques ind. au 5)
63. **Tournepierre à collier** (8 ind. au 5)
64. **Bécasseau variable** (3 ind. au 3 ; quelques ind. au 5)
65. **Bécasseau cocorli** (~10 au 3 ; 1 ind. au 5)
66. **Bécasseau falcinelle** (17 ind. au 5)
67. **Bécasseau temminck** (2 ind. au 3 ; quelques ind. au 5)
68. **Bécasseau minute** (1-2ind. au 3 ; quelques ind. au 5)
69. **Chevalier sylvain** (3 ; 4 ; 5)
70. **Chevalier culblanc** (3 ; 4 ; quelques ind. au 5 ; 6)
71. **Chevalier guignette** (~5 ind. au 3 ; 4 ; 5)
72. **Chevalier gambette** (3 ; 5)
73. **Chevalier arlequin** (3 ; 5)
74. **Chevalier aboyeur** (1 ind. au 5 ; 6)
75. **Chevalier stagnatile** (3 ; ~12 au 5)
76. **Barge à queue noire** (8 ind. au 3 ; 1 ind. au 5 ; 4 ind. au 6)
77. **Courlis cendré** (~30 au 3 ; quelques ind. ♂ au 4 ; quelques ind. au 5 ; quelques ond. ♂ au 6)
78. **Courlis corlieu** (1 ind. au 5)
79. **Bécassine des marais** (3 ind. au 3 ; 4 ind. au 4 ; 5)
80. **Phalarope à bec étroit** (8 ind. au 5)
81. **Combattant varié** (3 ; 4 ; 5 ; 6)
82. **Mouette rieuse** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
83. **Mouette mélanocéphale** (22 ind. au 5)
84. **Goléand railleur** (1 ind. au 5)
85. **Goéland pontique** (~35 depuis le Ferry boot (vers C"l"ra li) ; 1 au 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
86. **Mouette pygmée** (4 ; 5)
87. **Sterne naine** (1 ind. au 3 ; 5)
88. **Sterne caugek** (4 ind. au 5)
89. **Sterne hansel** (3-4 ind. au 3)
90. **Sterne pierregarin** (1 ind. au 1 ; 7 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 1 colonie au 5 ; 6)
91. **Sterne caspienne** (2 ind. au 5)
92. **Guifette noire** (5 ind. au 1 ; 2 ind. au 3 ; 5)
93. **Guifette leucoptère** (~10 ind. au 3 ; 5)
94. **Guifette moustac** (2 ad. et 2 juv. au 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
95. **Pigeon ramier** (6)
96. **Pigeon biset urbain** (présent dans les villes et villages ; 2 ; 4 ; 5 ; 6)
97. **Pigeon colombin** (2 ind. au 6)
98. **Tourterelle turque** (présente dans les villes et villages ; 2 ; 4 ; 5 ; 6)
99. **Tourterelle des bois** (1 ; ~10 ind. au 2)
100. **Coucou gris** (1 ind. au 1 ; ~3 ind. au 3 ; 2 ind. au 4)
101. **Petit-Duc scops** (~4 ♂ et 1 ind. observé très furtivement au 1)
102. **Chevêche d'Athéna** (1 ind. au 3 ; 1 au 4 ; 1 ind. au 5)
103. **Engoulevent d'Europe** (quelques ♂ et 3 ind. observés au 1)



104. **Martinet noir** (1 ind. à Constan|a ; quelques ind. depuis le bus à la sortie de Constan|a)
105. **Huppe fasciée** (1 ; 3 ind. au 2 ; ~5 ind. au 3 ; quelques ind. depuis le bus ; 4 ; 5 ; 6)
106. **Martin-pêcheur d'Europe** (1 ind. au 1 ; 3 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 1 ind. au 5 ; 6)
107. **Guêpier d'Europe** (~5 ind. vers C"l"ra|i ; 1 ; ~10 ind. au 2 ; 3 ; quelques ind. dans le village d'Istria ; 4 ; 5 ; 6)
108. **Rollier d'Europe** (~10 ind. vers C"l"ra|i ; ~12 ind. à Lipni|a (vers 1) ; ~30 ind. au 2 ; quelques ind. depuis le bus ; quelques ind. au 4 ; quelques ind. au 5 ; 6)
109. **Pic noir** (1 ind. au 4)
110. **Pic vert** (1)
111. **Pic cendré** (1 ind. au 1 ; 2 ind. au 4)
112. **Pic épeiche** (1 ; 1 ind. au 4)
113. **Pic syriaque** (1 juv. et 1 ind. à Lipni|a (vers 1) ; ~8 ind. au 4)
114. **Pic épeichette** (1-2 ind. au 1 ; 1 ind. au 4)
115. **Pic mar** (~5 ind. au 1 ; 1 ind. au 4)
116. **Torcol fourmilier** (1 au 1)
117. **Alouette des champs** (3 ; 4 ; 5)
118. **Cochevis huppé** (3 ind. au 2 ; 5)
119. **Alouette lulu** (~15 ind. au 1 ; 6 ind. au 2)
120. **Alouette calandre** (1 ind. au 4)
121. **Hirondelle de rivage** (dortoir de milliers d'ind. au 2 ; quantité impressionnante et indénombrable au 3 ; 4 ; 5 ; 6)
122. **Hirondelle rustique** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
123. **Hirondelle rousseline** (~15 ind. au 1)
124. **Hirondelle de fenêtre** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
125. **Pipit rousseline** (4 ind. au 3 ; quelques ind. au 4)
126. **Bergeronnette grise** (1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)
127. **Bergeronnette printanière** ( principalement ss-espèce *dombrowski*) (3 ; 4 ; 5)
128. **Rouge-gorge familier** (1 ind. au 4)
129. **Rossignol philomèle** (1 ind. au 6)
130. **Rossignol progné** (1 ind. au 1)
131. **Rouge-queue noir** (1 ind. au 5)
132. **Traquet motteux** (3 ind. au 1 ; 1 ind. au 2 ; ~10 ind. au 3 ; 4 ; 5)
133. **Tarier des prés** (2 ind. au 4 ; 2 ind. au 5)
134. **Grive musicienne** (quelques ind. au 1)
135. **Merle noir** (quelques ind. au 4)
136. **Fauvette à tête noire** (2X au 4)
137. **Fauvette baillarde** (~6-7 ind. au 2)
138. **Phragmite des joncs** (1 ind. au 2 ; 3 ind. au 3 ; 2 ind. au 4 ; ~5 ind. au 5)
139. **Locustelle tachetée** (1-2 ♂ au 2)
140. **Locustelle luscinoïde** (2 ind. au 5)
141. **Rousserolle effarvatte** (3 ; quelques ind. au 4 ; 5 ; 6)
142. **Rousserolle verderolle** (3 ind. au 2)
143. **Rousserolle isabelle** (~12 ind. au 3 ; 1 ind. au 5)
144. **Rousserolle turdoïde** (3 ind. au 1 ; 2 ind. au 2 ; 3 ; 1 ind. au 4 ; 5)
145. **Pouillot fitis** (1 ind. au 4)
146. **Pouillot véloce** (1 ind. au 4)
147. **Pouillot siffleur** (2 ind. au 4)
148. **Pouillot oriental** (5-6 ind. au 4)
149. **Gobe-mouche gris** (1 ind. au 3 ; 2-3 ind. au 4 ; 1 ind. au 5)
150. **Gobe-mouche nain** (1 ind. au 4)
151. **Mésange charbonnière** (1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6)
152. **Mésange bleue** (quelques ind. au 6)



153. **Mésange nonnette** (quelques ind. au 4)  
 154. **Mésange lugubre** (4 ind. au 4)  
 155. **Panure à moustaches** (~20 au 3 ; 5)  
 156. **Sittelle torchepot** (1 ; 4)  
 157. **Pie-grièche écorcheur** (1 ; 1 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 5)  
 158. **Pie-grièche à poitrine rose** (1 ind. depuis le bus allant à Lipni|a ; ~6-7 ind. au 1 ; 2 ind. au 2 ; 3 ; 4 ; 5)  
 159. **Pie bavarde** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)  
 160. **Geai des chênes** (1 ; 4)  
 161. **Choucas des tours** (ss-espèce *soemmerringii*) (4 ; 5 ; 6)  
 162. **Corbeaux freux** (depuis le train ; 1 ; 5)  
 163. **Corneille mantelée** (depuis le train ; 1 ; 1 ind. au 3 ; quelques ind. depuis le bus ; 4 ; 5 ; 6)  
 164. **Etourneau sansonnet** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5)  
 165. **Etourneau roselin** (~5 juv. au 2 ; 1 juv. et ~20 ad. au 3 ; ~5 juv. au 5)  
 166. **Loriot d'Europe** (1 ; 2 ; quelques ♂ au 3 ; quelques ind. au 4 ; 2 ind. au 6)  
 167. **Moineau domestique** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)  
 168. **Moineau friquet** (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)  
 169. **Pinson des arbres** (1 ; 2 ; 4)  
 170. **Chardonneret élégant** (quelques ♂ de vol au 3 ; ♂ de vol au 5)  
 171. **Linotte mélodieuse** (1 ind. au 4 ; 1 ind. au 5)  
 172. **Verdier d'Europe** (quelques ind. au 1)  
 173. **Grosbec casse-noyaux** (1 ; 4)  
 174. **Bruant proyer** (6-7 ind. au 4)  
 175. **Bruant des roseaux** (3 ; quelques ind. au 5)



## Quelques autres animaux marquant du voyage



- Chacal doré** (hurlent la nuit au 1)  
**Crapaud commun** (présent)  
**Mante religieuses** (présente)  
**Grenouille rieuse** (présente)  
**Grillon sp** (énorme espèce de grillon très présent au 1)  
**Lièvre brun** (1)  
**Chevreuril** (1)  
**Souslick** (2 ; 4)  
**Putois** (1 ind. au 2)  
**Couleuvre à collier** (2 ; 3)  
**Cistude d'Europe** (2 ; 3)  
**Couleuvre tesselée** (1 ind. au 2)  
**Sphinx du liseron** (ind. allant butiner à la tombée de la nuit au 1)

Dessins : *Aigle pomarin*(Romain Béguelin),  
*Marouette poussin*(Samuel Progin)  
*vol de Pélicans blancs* (Romain), *Rousserolle isabelle* (Samuel),  
*Pygargue à queue blanche* (Romain),  
*Gobemouche nain*, *Rossignol progné*, *Glaréole* (Samuel)  
*Buse des steppes* (Romain), *Pie-grièche à poitrine rose* (Samuel)  
*Busard pâle*, *Circaète Jean-le-Blanc* (Romain)  
*Aigle botté* (Samuel), *Epervier à pieds courts* (Romain),  
*Pic mar* (Samuel).